

# Bovisang®

**QUANDO IL SANGUE  
DIVENTA LINFA**

**100%  
SANGUE DI BUE**

## CONCIME ORGANICO AZOTATO A PRONTO EFFETTO

**Azoto (N) organico 13%**

Farina di sangue prodotta con moderne tecnologie che ne salvaguardano l'alto valore nutrizionale e sottoposta ad un particolare trattamento che ne riduce la polverosità senza comprometterne l'ottima dispersibilità in acqua.

Bovisang, totalmente naturale, incrementa la componente organica del terreno, contribuendo allo sviluppo della microflora e alla crescita della fertilità complessiva.

Pur contenendo una frazione proteica che assicura un apporto nutritivo di più lunga durata (fino a 2-3 mesi), Bovisang è soprattutto un concime azotato di pronto effetto da impiegare nelle fasi di più intenso sviluppo vegetativo (primavera/estate).

Il significativo contenuto di ferro, quasi tutto in forma chelata per la provenienza da un gruppo chelante naturale presente nell'emoglobina, contribuisce al rapido rinverdimento.

Consigliato nella concimazione degli ortaggi, delle fragole, dell'actinidia, dei fruttiferi e delle piante ornamentali; per la sua azione acidificante è molto indicato nella concimazione delle piante acidofile (ortensie, azalee, rododendri, ecc.).

Non applicare nelle ore più calde della giornata.



### SOMMINISTRAZIONE DIRETTA

Spargere uniformemente sul terreno, interrare leggermente e annaffiare

### ANNAFFIATURE FERTILIZZANTI

Stemperare la dose in poca acqua fino ad ottenere una pasta fluida e senza grumi. Aggiungere l'acqua necessaria per il dosaggio.

		SOMMINISTRAZIONE DIRETTA	ANNAFFIATURE FERTILIZZANTI
ORTAGGI E FRAGOLA		<b>250-300 grammi per 10 mq</b> 10 giorni prima e 20 giorni dopo la semina o il trapianto. Ripetere in piena estate	<b>50-70 grammi per 10 mq in 5-10 litri d'acqua</b> Ogni 15-20 giorni nel corso della fase vegetativa.
ORNAMENTALI		<b>200-250 grammi per 10 mq 10 grammi per vaso diametro 30 cm.</b> 3 volte all'anno: primavera, inizio estate, piena estate	<b>50 grammi per 10 mq in 5-10 litri d'acqua</b> Ogni 8-10 giorni nel corso della fase vegetativa.
PIANTE DA FRUTTO		<b>200-300 grammi per 10 mq (50-100 grammi per pianta) 2 volte all'anno:</b> inizio primavera e fine giugno. Dose più elevata per l'actinidia	<b>30-50 grammi per 10 mq in 5-10 litri d'acqua</b> Ogni 15-20 giorni nel corso della fase vegetativa.
INVASO E RINVASO		<b>100 grammi mescolati a 40 litri di terriccio</b>	

Formato	Codice	Codice EAN	Pezzi x cartone
500 gr	3103	8014815001048	12
2 Kg	3102	8014815001031	4