

EVOLUZIONE VERDE DAL 1848

2022

GIUGNO

CALENDARIO VERDE

PRODOTTI CONSIGLIATI DAGLI AGRONOMI

Che cosa occorre fare al prato a giugno?

- Alzare il taglio di circa 1-1,5 cm rispetto a quello che normalmente si esegue durante le stagioni ad alta intensità di crescita vegetativa
- Ridurre le concimazioni azotate a pronto effetto, prediligendo i fertilizzanti con azoto controllato e con un'alta presenza di potassio
- Allungare i cicli d'irrigazione con quantità abbondanti (fino a 10 litri/m2 nei mesi di luglio e agosto, o durante le fasi anticicloniche)
- Intervenire con Biostimolanti a base di Acidi umici e fulvici (VIGOR LIQUID) e/o con aminoacidi (ALWAYS) che contribuiscono a migliorare il metabolismo della pianta sotto stress riducendo gli effetti negativi, soprattutto quelli dei radicali liberi.

BIOSTIMOLANTI E BIOATTIVATI

CONCIMI GRANULARI E LIQUIDI





FLY

Inoculo micorrizico integrato contenente Beauveria, Metharizum e Lecanicillium. Trattamento liquido preventivo con effetto barriera contro gli insetti dannosi per il prato. **Dosaggio**: Radicale: 25-30 g/100 mq diluiti in 10-20 litri d'acqua

SI CONSIGLIA IN ABBINAMENTO A **ALWAYS (RADICALE)**



FIGHTER

SVILUPPO RADICALE

MYKO POWER

litri d'acqua

Concime organico azotato fluido a base di estratti di lieviti contiene alghe brune. Sviluppo di batteri utili contro gli agenti patogeni **Dosaggio**: Fogliare: 25-30 g/100 mq diluiti in 5-10 litri d'acqua

SI CONSIGLIA IN ABBINAMENTO A
PRE STRESS

Inoculo micorrizico integrato per il rispetto della natura

Dosaggio: Radicale, 20-40 g/100 mq diluiti in 10-20

facilitatore della manutenzione, aiuto per le piante

e il basso impatto ambientale. Miglioratore dei substrati,



SUMMER K 10-0-30

Antistress estivo ed invernale, conferisce alla vegetazione maggiore tolleranza agli stress termici e idrici. Evita la lisciviazione del potassio **Durata cessione:** 10-12 settimane

Dosaggio: 30-40 g/mq



PRO LIFE 10-5-15

+ 2 MgO + 0.5 Fe + Mn + Zn

Concimazione naturale antistress a favore del risparmio idrico e nutrizionale con acidi umici e fulvici da effettuarsi prima dei caldi estivi e dei freddi invernali, per irrobustire in modo naturale il tappeto erboso. Effetto ammendante.

Durata cessione: 6-10 settimane **Dosaggio:** 20-35 g/mq



NUTRAFORTE 4-3-8 + 2 MgO

Azione anti-stress, ripristino della biofertilità, irrobustimento e fascicolazione radicale PRIVO DI CATTIVI ODORI

Durata cessione: 10-12 settimane **Dosaggio:** 40-100 g/mq



Si-STRONG

Bioinduttore a base di Silicio e Potassio. Azione cicatrizzante sulle foglie. Evita l'accumulo di sostanze dannose all'interno delle superfici fogliari e dei frutti.

Dosaggio: Fogliare: 60-120 g/100 mq diluiti in 5-10 litri d'acqua

Radicale: 200 g/100 mq diluiti in 10-20 litri d'acaua



MASTER REEN MANUAL PROJECTION STOCK ALS AND LACETOR STOCK ALS AND



In caso di **semine tardive** si consiglia l'utilizzo di sementi conciate: **ROYAL BLUE PLUS, ROYAL SHADE PLUS E ROYAL STRONG PLUS** Molto importante la gestione dell'irrigazione nelle prime fasi di germinazione. L'obiettivo è quello di mantenere costantemente il terreno umido ma non zuppo.

